

การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากที่ได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันยุงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

๑. ภายในสำนักงาน ห้องพัก ดูแลความสะอาด เรียบร้อย พื้นที่ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับ ให้เป็นที่เกาะพักของยุง และง่ายต่อการให้พนักงานทำความสะอาดเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่

๒. ภาชนะรองรับน้ำ แก้วน้ำ แจกันดอกไม้ ตู้ปลา อ่างบัว ต้องหมั่นตรวจสอบเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ภาชนะรองรับน้ำที่ใช้ต้องสังเกตว่ามีรอยไข่ยุงลายดำๆ ติดอยู่ด้วยหรือไม่ เพราะไข่ยุงลายสามารถติดทนนานอยู่บนขอบภาชนะเหล่านั้นได้นานนับปี หากพบก็ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน้ำขัดออกหรือจะใช้แปรงขัดล้างทั้งภาชนะเททิ้งไปพร้อมน้ำบนพื้นดิน

๓. ควรกำจัดขยะ และเศษภาชนะทิ้งทุกวัน

๔. ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด ไม่ว่าจะป็นวิธีการทายากันยุง การจุดสมุนไพร หรือยาจุดไล่ยุง เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการควบคุมของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยการพ่นเคมี ทำลายยุงตัวเต็มวัย จำนวน ๒ ครั้ง ต่อเดือน ในการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยวิธีการ ดังนี้

๑. การฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำภายในสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นต้น

๒. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ในช่วงเวลากลางวัน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด

ภาพการดำเนินการพ่นสารเคมีแบบควัน ภายในมหาวิทยาลัย

